


FICHAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS

UAH Nº 01		SIERRA DE IRTA
SINGULARIZACIÓN: FORMACIONES FORESTALES SOBRE CALIZAS MESOZOICAS SUBPARALELAS A LA COSTA. LOCALIZACIÓN: MITAD SUR Y LÍMITE ESTE DEL MUNICIPIO. SUBTIPOS: MATORRAL MEDITERRÁNEO Y REPOBLACIONES DE PINO CARRASCO.		
MEDIO NATURAL		
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA		
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS Y DOLOMIAS DEL MESOZOICO. MORFOLOGÍA: ANTICLINAL CON EJE INVERSO AL SE. ALTURAS: 573 m A 150 m. PENDIENTES: FUERTES A MODERADAS. PROCESOS: CÁRSTICOS. EROSIÓN QUÍMICA DE LA CALIZA. TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES. BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA EROSIÓN POR LA ESCASA CUBIERTA ARBÓREA. APTITUD AGROLÓGICA: FORESTAL.		
HIDROLOGÍA		
TIPO DE DRENAJE: INFILTRACIÓN DIRECTA Y SUPERFICIAL. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA LLOMA DEL SEÑOR, BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE, BARRANC DE SAN PEDRO, BARRANC DE SANT ANTONI.		
SUPERFICIAL CURSOS DE AGUA: BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE, BARRANC DE SAN PEDRO, BARRANC DE SANT ANTONI.	SUBTERRÁNEA ACUÍFERO CARBONATADO.	
VEGETACIÓN NATURAL		
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum</i>) Y SERIE MESOMEDITERRÁNEA MANCHEGA Y ARAGONESA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Bupleuro rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum</i>). FORMACIONES PRESENTES: REPOBLACIONES DE PINO CARRASCO. MATORRAL DE <i>Quercus cocciferae- Pistacioleto lentisci</i> . ESPECIES: pino carrasco, <i>Pinus halepensis</i> , algarrobo, <i>Ceratonia siliqua</i> , encina <i>Quercus rotundifolia</i> , coscoja, <i>Q. coccifera</i> , lentisco, <i>Pistacia lentiscus</i> , bayón, <i>Osyris quadripartita</i> , esparraguera, <i>Asparagus albus</i> , brezo, <i>Erica multiflora</i> , romero, <i>Rosmarinus officinalis</i> , cada, <i>Juniperus oxycedrus</i> , palmito, <i>Chamaerops humilis</i> , <i>Anthyllis vulneraria</i> *, <i>Bupleurum frutescens</i> *.		
FAUNA		
ESPECIES: REPTILES: salamanquesa común, [<i>Tarentola mauritanica</i>], eslizón ibérico, [<i>Chalcides brediagai</i>]*, lagartija cenicienta, [<i>Psammodromus hispanicus</i>]*, lagarto ocelado, <i>Lacerta lepida</i> , serpiente de garriga, <i>Macropododon cucullatus</i> , culebra bastarda, <i>Malpolon monspessulanus</i> , culebra de escalera, [<i>Elaphe scalaris</i>]; AVES: vencejo pálido, [<i>Apus pallidus</i>], vencejo real, [<i>A. melba</i>], paloma zurita, <i>Columba oenas</i> , paloma torcaz, <i>C. palumbus</i> , tórtola común, <i>Streptopelia turtur</i> , chotacabras pardo, <i>Caprimulgus ruficollis</i> , chotacabras gris, [<i>C. europaeus</i>], becada, <i>Scolapax rusticola</i> , curruca rabilarga, [<i>Sylvia sarda</i>], curruca cabecinegra, [<i>S. melanocephala</i>], herrerillo capuchino, <i>Parus cristatus</i> , carbonero garrapino, <i>P. ater</i> , alcaudón común, <i>Lanius senator</i> , arrendajo, <i>Garrulus glandarius</i> , cuervo, <i>Corvus corax</i> , pinzón vulgar, <i>Fringilla coelebs</i> , pinzor real, <i>F. montifringilla</i> , jilguero, <i>Carduelis carduelis</i> , azor, [<i>Accipiter gentilis</i>], gavián, [<i>A. nissus</i>], águila calzada, [<i>Hieraetus pennatus</i>], águila culebrera, [<i>Circaetus gallicus</i>], aguilucho pálido, [<i>Circus cyaneus</i>], ratonero común, [<i>Buteo buteo</i>], águila perdicera, <i>Hieraetus fasciatus</i> , esmerejón, [<i>Falco columbarius</i>], búho chico, [<i>Asio otus</i>], autillo, [<i>Otus scops</i>], cárabo común, [<i>Strix aluco</i>], mochuelo, [<i>Athene noctua</i>]; MAMÍFEROS: zorro, <i>Vulpes vulpes</i> , tejón, <i>Meles meles</i> *, gineta, <i>Genetta genetta</i> , erizo europeo, <i>Erinaceus europaeus</i> , <i>M. myotis</i> , murciélago hortelano, murciélago patudo, <i>Myotis capaccinii</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>], murciélago ratonero grande, [<i>Eptesicus serotinus</i>]; CAZA MENOR.		

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN PROTECCIÓN, FORESTAL. CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y ARBÓREO ACLARADO. ÍNDICE DE COBERTURA: VARIABLE ENTRE 15 Y EL 50 %.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TORRE BADUM. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: YACIMIENTOS DE TORRE BADUM Y DEL POUAIG DE PEÑÍSCOLA Y ELS BARRANCS.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE CERCANO A LA NATURALIDAD. ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA. GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO A ALTO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: LEY 81/81 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 43/03 DE MONTES. AUTONÓMICA: LEY 3/1993 FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D 233/1994 REFERIDO A ACAMPADAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN MONTES DE LA COMUNIDAD, D 218/1994 POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE MICRORESERVA DE LA FLORA, LEY 11/1994 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D 202/1997 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 4/1998 DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO, LEY 9/1998 DE PESCA MARÍTIMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D 78/2001 PORN DE LA SIERRA DE IRTA, D 108/2002 DE DECLARACIÓN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SERRA DE IRTA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS, Y SE ESTABLECEN CATEGORÍAS Y NORMAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A ALTOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MEDIOS A ALTOS. RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EN GRAN PARTE DECLARADA PARQUE NATURAL Y ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS, DERIVADOS DEL TENDIDO ELÉCTRICO. FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1; ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, FORESTAL . ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
FUERTE EROSIÓN POR LA FALTA DE MASA ARBÓREA COSECUENCIA DE LOS REITERADOS INCENDIOS FORESTALES. EXISTENCIA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS SIN LAS MEDIDAS OPORTUNAS DE SEGURIDAD PARA LA AVIFAUNA. FUERTE PRESIÓN URBANÍSTICA EN LAS ÁREAS MÁS CERCANAS AL NÚCLEO URBANO DE PEÑÍSCOLA.



UAH Nº 02		DEPRESIONES COSTERAS DEL PLÁ DE PEBRET	
SINGULARIZACIÓN: MATERIALES ACUMULADOS A LAS FALDAS Y PIEDEMONTES DE LAS ELEVACIONES MONTAÑOSAS DE LA SIERRA DE IRTA.		LOCALIZACIÓN: EN LA MARGEN LITORAL EN EL SECTOR SUR DEL TÉRMINO MUNICIPAL.	
SUBTIPOS: RAMBLAS. MATORRALES CON PINAR.			
MEDIO NATURAL			
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA			
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CONGLOMERADOS, BLOQUES DE CALIZA Y CUARZO CON MATRIZ DE ARCILLA Y ARENA.		MORFOLOGÍA: CONOS ALUVIALES.	
ALTURAS: DE 225 A 75 M.		PENDIENTES: ESCASA A MEDIA PENDIENTE, AUMENTANDO PROGRESIVAMENTE HACIA EL NORESTE.	
PROCESOS: EDAFOGÉNESIS.		TIPOS DE SUELOS: CAMBISOLES CÁLCICOS.	
BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVO.		APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA.	
HIDROLOGÍA			
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL DIRECTA Y ESCORRENTÍA.		CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA LLOMA DEL SENYOR, BARRANC DE SAN PEDRO, BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE.	
SUPERFICIAL		SUBTERRÁNEA	
CURSOS DE AGUA: BARRANC DE SAN PEDRO, BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE.		ACUÍFERO CARBONATADO. ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.	
VEGETACIÓN NATURAL			
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum</i>) y geoserie riparia de las ramblas o adelfares (<i>Rubo-Nerietum oleandri</i>).		FORMACIONES PRESENTES: PINARES NATURALIZADOS Y MATORRAL DE <i>Quercus cocciferae- Pistacieto lentisci</i> Y DE <i>Rubo-Nerietum oleandri</i> .	
ESPECIES: Pino carrasco, <i>Pinus halepensis</i> , algarrobo <i>Ceratonia siliqua</i> , acebuche, <i>Olea europaea sylvestris</i> , coscoja <i>Quercus coccifera</i> , lentisco, <i>Pistacia lentiscus</i> , esparraguera, <i>Asparagus albus</i> , brezo <i>Erica multiflora</i> , palmito, <i>Chamaerops humilis</i> , adelfa, <i>Nerium oleander</i> , zarzamora, <i>Rubus ulmifolius</i> , junco, <i>Scirpus holoschoenus</i> , olmo, <i>Ulmus minor</i> , romero, <i>Rosmarinus officinalis</i> , cada, <i>Juniperus oxycedrus</i> , <i>Distichoselinum tenuifolium</i> , <i>Anthyllis vulneraria</i> *, <i>Bupleurum frutescens</i> *.			
FAUNA			
ESPECIES: ANFIBIOS: rana común, <i>Rana perezi</i> , sapo común, <i>Bufo bufo</i> ; REPTILES: salamanquesa común, [<i>Tarentola mauritanica</i>], salamanquesa costera, [<i>Hemidactylus turcicus</i>], lagartija colilarga, <i>Psammodromus algirus</i> , culebra bastarda, <i>Malpolon monspessulanus</i> , culebra de escalera, [<i>Elaphe scalaris</i>]; AVES: vencejo pálido, [<i>Apus pallidus</i>], vencejo real, [<i>Apus melba</i>], paloma zurita, <i>Columba oenas</i> , paloma torcaz, <i>Columba palumbus</i> , tórtola común, <i>Streptopelia turtur</i> , chotacabras pardo, <i>Caprimulgus ruficollis</i> , curruca rabilarga, [<i>Sylvia sarda</i>], curruca cabecinegra, [<i>Silvia melanocephala</i>], herrerillo capuchino, <i>Parus cristatus</i> , carbonero garrapino, <i>Parus ater</i> , alcaudón común, <i>Lanius senator</i> , arrendajo, <i>Garrulus glandarius</i> , pinzón vulgar, <i>Fringilla coelebs</i> , jilguero, <i>Carduelis carduelis</i> , azor, [<i>Accipiter gentilis</i>], ratonero común [<i>Buteo buteo</i>], mochuelo, [<i>Athene noctua</i>], chotacabras gris, [<i>Caprimulgus europaeus</i>]; MAMÍFEROS: zorro, <i>Vulpes vulpes</i> , erizo común, <i>Erinaceus europaeus</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>]; CAZA MENOR.			
MEDIO SOCIOECONÓMICO			
USOS Y APROVECHAMIENTOS			
APROVECHAMIENTOS: AGROGANADEROS FORESTALES.		CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y PUNTUALMENTE ARBÓREA.	
ÍNDICE DE COBERTURA: EN TORNO AL 25%.			
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL			
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: NO PRESENTA.		YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO PRESENTA.	
PAISAJE			
TIPOLOGÍA: PAISAJE PANORÁMICO CON MODELADO ANTRÓPICO, BANCALES.		MEDIA-ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA, MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA.	
GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO A ALTO.			
LEGISLACION AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL			
ESTATAL:		LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 43/03 DE MONTES.	
AUTONÓMICA:		LEY 4/2004, DE 30 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE, D156/1999, DE 17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 3/1993, DE 9 DE DICIEMBRE, FORESTAL, D 233/1994, DE 8 DE NOVIEMBRE REFERIDAS A ACAMPADAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN MONTES DE LA COMUNIDAD, LEY 11/1994, DE 27 DE DICIEMBRE, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D 78/2001 DE 2 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PORN DE LA SIERRA DE IRTA, D 108/2002, DE 16 DE JULIO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SIERRA DE IRTA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS, Y SE ESTABLECEN CATEGORÍAS Y NORMAS PARA SU PROTECCIÓN.	
CAPACIDAD DE USO			
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES			
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS.		RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADO A ALTOS.	
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS.		RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.	
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS.		RIESGOS TECNOLÓGICOS: -----	
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE III: CON CALIDAD ALTA A MEDIA Y FRAGILIDAD VISUAL VARIABLE.			
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS			
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. FORESTAL. USO PÚBLICO.		ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA ADECUACIÓN, SI BIEN SE DEBERÍA TENDER A UNA EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE ESTOS ESPACIOS QUE PONGA EN VALOR TODO SU POTENCIAL DE USOS TRADICIONALES Y ACOJA TAMBIÉN LA DEMANDA ACTUAL DE OTROS NUEVOS, COMO EL TURISMO RURAL CON O SIN ALOJAMIENTO, CULTIVOS ECOLÓGICOS, PLANTAS AROMÁTICAS, ETC.	
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL			
ABANDONO DE LAS LABORES DE CLAREO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE.		PERDIDA DE SUELOS RELACIONADO CON LA FALTA DE ESTRATO ARBÓREO Y LAS LLUVIAS TORRENCIALES.	


UAH Nº 02
DEPRESIONES COSTERAS DEL PLÁ DE PEBRET






UAH Nº 03		CULTIVOS LEÑOSOS	
SINGULARIZACIÓN: CULTIVOS EN SECANO DE OLIVAR Y FRUTALES.		MEDIO SOCIOECONÓMICO	
LOCALIZACIÓN: EN EL PIEDEMONTE DE LOS MONTES LOCALIZADOS AL NORESTE DEL LÍMITE MUNICIPAL.		USOS Y APROVECHAMIENTOS	
SUBTIPOS: ----		APROVECHAMIENTOS: AGRÍCOLA PRINCIPALMENTE DE SECANO Y REGADÍOS PUNTUALES. CINEGÉTICO. VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	
MEDIO NATURAL		CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA Y ARBÓREA.	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA		ÍNDICE DE COBERTURA: 10%.	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CONGLOMERADOS. BLOQUES DE CUARZO Y CALIZA CON ARENAS, LIMOS Y ARCILLAS.		PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	
MORFOLOGÍA: PIEDEMONTE.		ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----	
ALTURAS: DE 300 m A 150 m.		YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: ----	
PENDIENTES: MODERADAS A SUAVES.		PAISAJE	
PROCESOS: REGULACIÓN DE LADERA. EDAFOGÉNESIS.		TIPOLOGÍA: PAISAJE AGRÍCOLA DE OLIVARES Y FRUTALES. ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA, MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA.	
TIPOS DE SUELOS: LITOSUELOS Y LUVISOLES CÁLCICOS.		GRADO DE NATURALIDAD: BAJO.	
BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVO.		LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL	
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA.		ESTATAL:	
HIDROLOGÍA		LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, LEY 43/03 DE MONTES.	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL E INFILTRACIÓN DIRECTA.		AUTONÓMICA:	
CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE ALCALÁ.		D 156/1999 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 3/1993 FORESTAL, D 233/1994 REFERIDO A ACAMPADAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN MONTES DE LA COMUNIDAD, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	
SUPERFICIAL		CAPACIDAD DE USO	
CURSOS DE AGUA: PEQUEÑOS		VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES	
ARROYOS.		RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A ALTOS.	
VEGETACIÓN NATURAL		RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS EN ENTORNO DE LA RAMBLA DE ALCALÁ.	
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum</i>).		RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS A ALTOS.	
FORMACIONES PRESENTES: SETOS Y ERIALES.		RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.	
ESPECIES: Coscoja, <i>Quercus coccifera</i> , lentisco, <i>Pistacia lentiscus</i> , palmito, <i>Chamaerops humilis</i> . RUDERALES Y ANTROPÓFILAS.		RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS.	
FAUNA		RIESGOS TECNOLÓGICOS: DERIVADOS DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN RODADA.	
ESPECIES: REPTILES: salamanquesa común, [<i>Tarentola mauritanica</i>], culebra bastarda, <i>Malpolon monspessulanus</i> ; AVES: cogujada, [<i>Galerida cristata</i>], bisbita campestre, [<i>Anthus campestris</i>], lavandera blanca, [<i>Motacilla alba</i>], curruca cabecinegra, [<i>Silvia melanocephala</i>], urraca, <i>Pica pica</i> , tarabilla común, [<i>Saxicola torquata</i>], pinzón vulgar, [<i>Fringilla coelebs</i>], verdecllo, <i>Serinus serinus</i> , verderón común, <i>Carduelis chloris</i> , jilguero, <i>C. carduelis</i> , petirrojo [<i>Erithacus rubecula</i>], mosquitero común, [<i>Phylloscopus collybita</i>], ratonero común, [<i>Buteo buteo</i>], mochuelo, [<i>Athene noctua</i>]; MAMÍFEROS: zorro, <i>Vulpes vulpes</i> , erizo europeo, <i>Erinaceus europaeus</i> , topillo mediterráneo, <i>Pytimus duodecimcostatus</i> , ratón de campo, <i>Apodemus sylvaticus</i> , rata negra, <i>Rattus rattus</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>]; ANTROPÓFILA. CAZA MENOR.		FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2; ALTA CALIDAD Y AMPLIO RANGO DE FRAGILIDAD.	
		APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS	
		APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA DE SECANO.	
		ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA.	
		PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL	
		CONTAMINACIÓN POR FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES. VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ABANDONO DE LAS LABORES AGRÍCOLAS.	

UAH Nº 03
CULTIVOS
LEÑOSOS




UAH Nº 04	HUERTAS DE VILARS ROJOS Y MESQUITA
SINGULARIZACIÓN: CULTIVOS DE HUERTA Y FRUTALES EN REGADÍOS DE LA VEGA DEL RÍO SECO. LOCALIZACIÓN: MITAD NORTE DEL MUNICIPIO. SUBTIPOS: PARCELARIO HORTOFRUTÍCOLA. DISEMINADO RURALURBANO.	
MEDIO NATURAL	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CANTOS CALIZOS CON ARENAS Y ARCILLA, MATERIAL ALUVIAL. MORFOLOGÍA: VEGA ALUVIAL. ALTURAS: < 75 m. PENDIENTES: SUAVES. PROCESOS: EDAFOGÉNESIS. TIPOS DE SUELOS: LUVISOL CÁLCICO. BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVA. APTITUD AGROLÓGICA: MUY BUENA.	
HIDROLOGÍA	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL E INFILTRACIÓN DIRECTA. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE ALCALÁ.	
SUPERFICIAL CURSOS DE AGUA: PEQUEÑOS ARROYOS VERTIENTES A LA RAMBLA DE ALCALÁ.	SUBTERRÁNEA ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.
VEGETACIÓN NATURAL	
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum</i>). FORMACIONES PRESENTES: SETOS Y ERIALES. ESPECIES: Coscoja, <i>Quercus coccifera</i> , lentisco, <i>Pistacia lentiscus</i> , palmito, <i>Chamaerops humilis</i> . RUDERALES Y ANTROPÓFILAS.	
FAUNA	
ESPECIES: anfibios: rana común, <i>Rana perezi</i> , sapo común, <i>Bufo bufo</i> ; REPTILES: salamanquesa común, [<i>Tarentola mauritanica</i>], culebra bastarda, <i>Malpolon monspessulanus</i> ; AVES: vencejo común, [<i>Apus apus</i>], golondrina común, [<i>Hirundo rustica</i>], avión común, [<i>Delichón urbica</i>], bisbita campestre, [<i>Anthus campestris</i>], lavandera blanca, [<i>Motacilla alba</i>], curruca cabecinegra, [<i>Sylvia melanocephala</i>], urraca, <i>Pica pica</i> , tarabilla común, [<i>Saxicola torquata</i>], pinzón vulgar, [<i>Fringilla coelebs</i>], verdicillo, <i>Serinus serinus</i> , verderón común, <i>Carduelis chloris</i> , jilguero, <i>C. carduelis</i> , petirrojo [<i>Erithacus rubecula</i>], mosquitero común, [<i>Phylloscopus collybita</i>]; MAMÍFEROS: topillo mediterráneo, <i>Pytimus duodecimcostatus</i> , ratón de campo, <i>Apodemus sylvaticus</i> , rata negra, <i>Rattus rattus</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>]; ANTROPÓFILA. CAZA MENOR.	

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: AGRÍCOLA DE REGADÍO. CINEGÉTICO. URBANO EN DISEMINADO. CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA Y ARBUSTIVA. ÍNDICE DE COBERTURA: < 5%.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CONSTRUCCIONES POPULARES: CASETES DE PEDRA, VOLTAS, PALLISSAS Y OTRAS. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: AGRÍCOLA, SALVO EN LAS PORCIONES DOMINADAS POR EL DISEMINADO URBANO. GRADO DE NATURALIDAD: BAJO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. AUTONÓMICA: D 156/1999 PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 3/1993 FORESTAL, LEY 10/2000 DE RESIDUOS, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. RIESGOS TECNOLÓGICOS: ----- FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE IV; FRAGILIDAD MEDIA Y BAJA CALIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA. ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA PERO CON EXCESIVO CONSUMO DE AGUA Y FITOSANITARIOS.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
CONTAMINACIÓN POR FERTILIZANTES Y PESTICIDAS. MÉTODOS DE RIEGO NO SOSTENIBLES. VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS. EMPLEO DE MÉTODOS DE CAZA NO SELECTIVOS (PARANYS). EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DE LA PROLIFERACIÓN RESIDENCIAL FUERA DE ORDENACIÓN.




UAH Nº 05		RAMBLA DE ALCALÁ	
SINGULARIZACIÓN: CAUCE ESTACIONAL EN ESTADO SECO EN GRAN PARTE DEL AÑO. LOCALIZACIÓN: CRUZANDO LA VEGA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO. SUBTIPOS: -----			
MEDIO NATURAL			
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA			
MATERIALES CONSTITUTIVOS: BLOQUES CALIZOS Y DEPÓSITOS DE MATERIAL ALUVIAL. MORFOLOGÍA: RAMBLA. CAUCE ENCAJADO CON TERRAZAS FLUVIALES EN SUS MÁRGENE. ALTURAS: 15 m y 72 m. PENDIENTES: SUAVES Y MUY SUAVES. PROCESOS: EROSIVOS, DENUDATIVOS. TIPOS DE SUELOS: FLUVISOLES Y LITOSOLES. BALANCE MORFOEDÁFICO: NEGATIVO. PREDOMINIO DE LA EROSIÓN. APTITUD AGROLÓGICA: SIN APTITUD AGROLÓGICA.			
HIDROLOGÍA			
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE ALCALÁ.			
SUPERFICIAL		SUBTERRÁNEA	
CURSOS DE AGUA: RAMBLA DE ALCALÁ.		ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.	
VEGETACIÓN NATURAL			
FORMACIONES POTENCIALES: GEOSERIE RIPARIA DE RAMBLAS (ADELFARES). FORMACIONES PRESENTES: CAÑAVERALES Y RUDERALES. ESPECIES: Caña, <i>Arundo donax</i> , carrizo, <i>Phragmites australis</i> , adelfa, <i>Nerium oleander</i> , zarzamora, <i>Smilax aspera</i> , juncos, <i>Juncus spp.</i> FLORA RUDERAL.			
FAUNA			
ESPECIES: ANFIBIOS: rana común, <i>Rana perezi</i> , sapo común, <i>Bufo bufo</i> ; AVES: garcilla bueyera, <i>[Bubulcus ibis]</i> , la garceta común, <i>[Egretta garzetta]</i> , la garza real, <i>[Ardea cinerea]</i> , ánade azulón, <i>Anas platyrhynchos</i> , avión roquero, <i>[Hirundo rupestris]</i> , avión zapador, <i>[Riparia riparia]</i> , lavandera blanca, <i>[Motacilla alba]</i> , carricerín real, <i>[Crocephalus melanopogon]</i> , carricero común, <i>[Acrocephalus scirpaceus]</i> , zarcero común, <i>[Hippolais polyglotta]</i> , CAZA MENOR.			

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA Y ARBUSTIVA. ÍNDICE DE COBERTURA: <5%.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE RURAL FLUVIAL. VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA ALTA. GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO A ALTO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, LEY 43/03 DE MONTES.
AUTONÓMICA: D 156/1999 PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 2/199 DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, D 202/1997 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, LEY 10/2000 DE RESIDUOS, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004 REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS. RIESGOS TECNOLÓGICOS: DERIVADOS DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN RODADA. FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1; ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN-CONSERVACIÓN. ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
RESIDUOS SÓLIDOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. ASENTAMIENTOS HUMANOS MUY PRÓXIMOS AL CAUCE. VERTIDOS RESIDUALES LÍQUIDOS. ELIMINACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES DE MÁRGENES POR LA AGRICULTURA. CONTAMINACIÓN POR FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES.




UAH Nº 06 MARJAL DE PEÑÍSCOLA	
SINGULARIZACIÓN: ZONA HÚMEDA POSTERIOR AL LITORAL FORMADA COMO CONSECUENCIA DE LA CERCANÍA A LA SUPERFICIE DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO. LOCALIZACIÓN: AL NORTE DEL NÚCLEO POBLACIONAL DE PEÑÍSCOLA. SUBTIPOS: -----	
MEDIO NATURAL	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CANTOS CALIZOS CON ARENAS Y ARCILLA, MATERIAL ALUVIAL. MORFOLOGÍA: HUMEDAL INTERRUPTIDO POR CANALES ARTIFICIALES. ALTURAS: 1 m a 5 m. PENDIENTE: MUY SUAVE. PROCESOS: COLMATACIÓN. TIPOS DE SUELOS: XEROFLUVENT. FLUVISOL. BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVO. APTITUD AGROLÓGICA: ESCASA.	
HIDROLOGÍA	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL E INFILTRACIÓN DIRECTA. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR.	
SUPERFICIAL CURSOS DE AGUA: CANALES ARTIFICIALES.	SUBTERRÁNEA ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.
VEGETACIÓN NATURAL	
FORMACIONES POTENCIALES: JUNCALES HALÓFITOS (<i>Schoeno nigricantis-Plantaginietum crassifolia</i>). FORMACIONES PRESENTES: CAÑAVERALES Y JUNCALES DE LA ASOCIACIÓN <i>Schoeno nigricantis- Plantaginietum crassifolia</i> . ESPECIES: caña, <i>Arundo donax</i> , carrizo, <i>Phragmites communis</i> , enea, <i>Typha domingensis</i> , juncos, <i>Juncus acutus</i> , <i>J. maritimus</i> , <i>Scoenus nigricans</i> , <i>Plantago crassifolia</i> .	
FAUNA	
ESPECIES: ANFIBIOS: rana común, <i>Rana perezi</i> , sapo común, <i>Bufo bufo</i> , gallipato [<i>Pleurodeles waltl</i>]; REPTILES: culebra de agua, [<i>Natrix maura</i>]; PECES: lisas, <i>Chelon labrosus</i> , <i>Liza spp.</i> , <i>Mugil cephalus</i> , barbos, <i>Barbus spp.</i> , carpas <i>Cyprinus carpio</i> , samaruc, <i>Valencia hispanica</i> , fartet, <i>Aphanius iberus</i> , punsoxet, <i>Gasterosteus gymmurus</i> ; AVES: vencejo pálido, [<i>Apus pallidus</i>], vencejo común, [<i>Apus apus</i>], vencejo real, [<i>Apus melba</i>], golondrina común, <i>Hirundo rustica</i> , avión común, <i>Delichón urbica</i> , lavandera blanca, [<i>Motacilla alba</i>], somormujo lavanco, [<i>Podiceps cristatus</i> , garcilla buellera, [<i>Bubulcus ibis</i>], garceta común [<i>Egretta garzetta</i>], garza real [<i>Ardea cinerea</i>], garza imperial, [<i>A. purpurea</i>], garcilla cangrejera, <i>Ardeola ralloides</i> , charrán común, <i>Sterna hirundo</i> , cigüeñuela, [<i>Himantopus himantopus</i>], garza imperial, ánade real, <i>Anas platyrhynchos</i> , pato cuchara, <i>A. clypeata</i> , ánade friso, <i>A. strepera</i> , cerceta común, <i>Anas crecca</i> , porrón moñudo, <i>Aythya fuligula</i> , serrada meriada, <i>Mergus serrator</i> , focho cornuda, <i>Fulica cristata</i> , cerceta pardilla, <i>Marmaronetta angustirostris</i> (en reintroducción), zampullín chico, [<i>Tachybaptus ruficollis</i>], zampullín cuellinegro, [<i>Podiceps nigricollis</i>], carricerín real, [<i>Crocephalus melanopogon</i>], carricero común, [<i>Acrocephalus scirpaceus</i>], zarcero común, [<i>Hippolais polyglotta</i>], aguilucho lagunero, <i>Circus auruginosus</i> , CAZA MENOR.	

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEO Y ARBUSTIVO. ÍNDICE DE COBERTURA: EN TORNO AL15%.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: HUMEDAL CON CUBIERTA VEGETAL DE CAÑAS, ENEAS Y CARRIZOS CON CANALES ARTIFICIALES (ACEQUIAS). MEDIA-ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA, BAJA VISIBILIDAD INTRINSECA. GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO-ALTO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, LEY 43/03 DE MONTES. AUTONÓMICA: D 156/1999 PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 3/1993 FORESTAL, LEY 11/1994 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, LEY 10/2000 DE RESIDUOS, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004 CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. INCLUIDO EN EL PROYECTO DE CATÁLOGO DE ZONAS HÚMEDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DECLARADA COMO ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. RIESGOS TECNOLÓGICOS: POR PROXIMIDAD DE USOS URBANOS. FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1; ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA. EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y URBANÍSTICA.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
FUERTE PRESIÓN URBANÍSTICA Y AGRÍCOLA. AMENAZA SOBRE ESPECIES ENDÉMICAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE SUS AGUAS. EXISTENCIA DE EDIFICACIONES. VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS (ESCOMBROS). EN EJECUCIÓN LA REGENERACIÓN AMBIENTAL DEL MARJAL DE PEÑÍSCOLA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR QUE INCLUYE LA NATURALIZACIÓN DE LAS ACEQUIAS Y CANALES, LA ELIMINACIÓN DE VERTIDOS INCONTROLADOS Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE CANALES. LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT DEL SAMARUC Y DEL FARTET, LA PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HÁBITAT DE LA CERCETA PARDILLA Y LA REINTRODUCCIÓN DE FLORA ENDÉMICA.



UAH Nº 07		CALAS Y ACANTILADOS DE PEÑÍSCOLA	
SINGULARIZACIÓN: ACANTILADOS COSTEROS CALIZOS CON PEQUEÑAS CALAS EN SUS ENTRANTES.			
LOCALIZACIÓN: COSTA SUR DEL TÉRMINO.			
SUBTIPOS: PAREDONES ACANTILADOS, CALAS ROCOSAS, DUNAS.			
MEDIO NATURAL			
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA			
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS MESOZOICAS. CONGLOMERADOS, BLOQUES DE CALIZA Y CUARZO CON MATRIZ DE ARCILLA Y ARENA.			
MORFOLOGÍA: ENTRANTES Y SALIENTES ROCOSOS.			
ALTURAS: 0m y 100 m.			
PENDIENTES: MUY FUERTES.			
PROCESOS: EROSIVOS.			
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES.			
BALANCE MORFOEDÁFICO: NEGATIVA.			
APTITUD AGROLÓGICA: -----			
HIDROLOGÍA			
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.			
CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR, BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE, BARRANC DE SANT ANTONI, LLOMA DEL SENYOR, BARRANC DE SAN PEDRO.			
SUPERFICIAL		SUBTERRÁNEA	
CURSOS DE AGUA: BARRANC DE SAN PEDRO, BARRANC DEL POVER D'EDRI DEL VOLANTE.		ACUÍFERO CARBONATADO. ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.	
VEGETACIÓN NATURAL			
FORMACIONES POTENCIALES: GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES COSTEROS.			
FORMACIONES PRESENTES: GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES COSTEROS.			
ESPECIES: <i>Centaurea saguntina</i> *, oruga marina, <i>Cakile marítima</i> , barrilla pinchosa <i>Salsola kali</i> , correjuela marina <i>Polygonum maritimum</i> , <i>Agropyron junceum</i> , <i>Elymus farctus</i> , campanilla de mar, <i>Calystegia soldanella</i> , <i>Sporobolus arenarius</i> , <i>Polygonum maritimum</i> , hierba de plata, <i>Medicago marina</i> , zanhoria bastarda, <i>Echinophora spinosa</i> , lechetrezna de mar, <i>Euphorbia paralias</i> , algodonosa, <i>Otanthus maritimus</i> , violeta de mar, <i>Calystegia soldanella</i> , <i>Cutandia marítima</i> , <i>Silene ramosissima</i> , <i>Pseudodorlaya pumila</i> , pegamoscas, <i>Ononis natrix</i> , siempreviva, <i>Helichrysum stoechas</i> , hierba del humor, <i>Teucrium dunense</i> , rubia marina, <i>Crucianella marítima</i> , <i>Maresia nana</i> , madreSelva, <i>Lonicera implexa</i> , zarzaparrilla, <i>Smilax aspera</i> , falso aladierno, <i>Phyllirea angustifolia</i> , amapola marina, <i>Glacium flavum</i> , alelí de mar, <i>Manthiola sinuata</i> , llantén marino, <i>Plantago crassifolia</i> , <i>Sideritis tragoriganum</i> , hinojo marino, <i>Crithmun maritimum</i> , artemisa, <i>Artemisia gallica</i> , <i>Erodium sanguis-christi</i> *, <i>Antirrhinum barrelieri</i> *, <i>Satureja innotata</i> *, <i>Biscutella valentina</i> *, <i>Centaurea saguntina</i> , <i>Centaureum quadrifolium</i> *, <i>Crepis albida</i> *, <i>Dianthus broteri</i> *, <i>Dianthus pungens</i> *, <i>Galium lucidum</i> *, <i>Helianthemum marifolium</i> *, <i>Mercurialis tormentosa</i> *, <i>Satureja obovata</i> *, <i>Sideritis tragoriganum</i> *, <i>Silene melifera</i> *, <i>Sonchus tenerimus</i> *, <i>Teucrium capitatum</i> *, saladilla, <i>Limonium girardianum</i> , saladilla de Peñíscola, <i>L. cavallinesii</i> *.			
FAUNA			
ESPECIES: REPTILES: salamanguera común, [<i>Tarentola mauritanica</i>], salamanguera costera, <i>Hemidactylus turcicus</i> , tortuga mediterránea, <i>Testudo hermanni hermanni</i> , lagartija colirroja, <i>Acanthodactylus erythrurus</i> , lagartija colilarga, [<i>Psammodromus algirus</i>], culebrilla ciega, <i>Blanus cinerius</i> , víbora hocicuda, <i>Vipera latastei</i> . AVES: vencejo pálido, [<i>Apus pallidus</i>], vencejo común, [<i>A. apus</i>], vencejo real, [<i>A. melba</i>], golondrina común, [<i>Hirundo rustica</i>], avión roquero, [<i>H. rupestris</i>], avión común, [<i>Delichón urbica</i>], avión zapador, [<i>Riparia riparia</i>], paloma bravia, <i>Columba livia</i> , cormorán grande, <i>Phalacrocorax carbo</i> , cormorán moñudo, [<i>Ph. aristotelis</i>], alcaraván, [<i>Burdinus oedicnemus</i>], gaviota de Audouin, <i>Larus audouinii</i> , gaviotas, <i>Larus spp.</i> , gaviota cabecinegra, [<i>L. melanocephalus</i>], garcilla buellera, [<i>Bubulcus ibis</i>], garceta común, [<i>Egretta garzetta</i>], garza real, [<i>Ardea ciñerea</i>], garza imperial, [<i>Ardea purpurea</i>], pardela cenicienta, <i>Calonectris diomedea</i> , pardela pichoneta, [<i>Puffinus puffinus</i>], alca, [<i>Alca torda</i>], charrán común, [<i>Sterna hirundo</i>], charrán patinegro, [<i>Sterna sandvicensis</i>], charrancito, [<i>Sterna albifrons</i>], chorlito chico, [<i>Charadrius dubius</i>], chorlito patinegro, [<i>Ch. alexandrinus</i>], andarríos chico, [<i>Actitis hypoleucos</i>], archibebe común, <i>Tringa totanus</i> , somormujo lavanco, [<i>Podiceps cristatus</i>], roquero solitario, [<i>Monticola solitarius</i>], alcón peregrino, [<i>Falco peregrinus</i>], cernícalo vulgar, [<i>F. tinnunculus</i>], cernícalo primilla, <i>F. naumanni</i> . MAMÍFEROS: murciélago patudo, <i>Myotis capaccinii</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>], murciélago ratonero grande, [<i>Myotis myotis</i>].			


MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. BALNEARIO.
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA Y ARBUSTIVA.
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5%.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: RESTOS DE LA TORRE NOVA.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE LITORAL PANORÁMICO. ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA, ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: ALTO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 38/89 NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, LEY 43/03 DE MONTES.
AUTONÓMICA:
D 218/1994 POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE MICRORESERVA DE LA FLORA, LEY 11/1994 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LEY 10/2000 DE RESIDUOS, D 78/2001 PORN DE LA SIERRA DE IRTA, D 108/2002 POR EL QUE SE DECLARA EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SIERRA DE IRTA, D 32/2004 CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. PRESENCIA DE NUMEROSOS ENDEMISMOS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. EN GRAN PARTE DECLARADA PARQUE NATURAL Y ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: -----
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE I; ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA. INCLUIDA EN GRAN PARTE EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS. ESCASA E INADECUADA PUESTA EN USO DE SU ALTO POTENCIAL TURÍSTICO.



UAH Nº 07
CALAS Y
ACANTILADOS
DE PEÑÍSCOLA

UAH Nº 08PLAYAS TENDIDAS DE COSTA AZAHÁR	
SINGULARIZACIÓN: PLAYAS AMPLIAS DE ARENA FINA Y RESTOS CONCHÍFEROS. LOCALIZACIÓN: MITAD NORTE DEL MUNICIPIO CONTINUANDO EN BENICARLÓ. SUBTIPOS: -----	
MEDIO NATURAL	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS CUARZIFERAS CON RESTOS CONCHÍFEROS. MORFOLOGÍA: EXTENSAS PLAYAS DE ESCASA PENDIENTE. ALTURAS: 0 m a 3 m. PENDIENTES: MUY SUAVES. PROCESOS: DERIVA LITORAL. TIPOS DE SUELOS: ARENOSOS ALBICOS. BALANCE MORFOEDÁFICO: NEGATIVO. APTITUD AGROLÓGICA: -----	
HIDROLOGÍA	
TIPO DE DRENAJE: INFILTRACIÓN DIRECTA. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE ALCALÁ.	
SUPERFICIAL CURSOS DE AGUA: RAMBLA DE TERME.	SUBTERRÁNEA ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.
VEGETACIÓN NATURAL	
FORMACIONES POTENCIALES: GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES COSTEROS ASOCIACIÓN <i>Salsola kali-Cakiletum maritimae</i> . FORMACIONES PRESENTES: FASES REGRESIVAS DE LA ASOCIACIÓN <i>Salsola kali-Cakiletum maritimae</i> . RUDERALES Y ANTROPÓFILAS. ESPECIES: oruga marina, <i>Cakile maritima</i> , barrilla pinchosa, <i>Salsola kali</i> , correguela marina <i>Polygonum maritimum</i> . FLORA RUDERAL Y ANTROPÓFILA.	
FAUNA	
ESPECIES: REPTILES: lagartija colirroja, <i>Acanthodactylus erythrurus</i> ; AVES: gaviotas, <i>Larus spp.</i> , garceta común, <i>[Egretta garzetta]</i> , garza real, <i>[Ardea cinerea]</i> , pardela cenicienta, <i>Calonectris diomedea</i> , pardela pichoneta <i>[Puffinus puffinus]</i> , charrán común <i>[Sterna hirundo]</i> , charrán patinegro, <i>[S. sandvicensis]</i> , chorlitejo chico <i>[Charadrius dubius]</i> , chorlitejo patinegro <i>[Ch. alexandrinus]</i> , andarrio chico, <i>[Actitis hypoleucos]</i> , archibebe común <i>Tringa totanus</i> . ANTROPÓFILA.	

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: BALNEARIO. TURÍSTICO-DEPORTIVO. CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA. ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 3%.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PLAYA LINEAL CONTINUA. ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO POR REGENERACIÓN ARTIFICIAL.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. AUTONÓMICA: LEY 2/1992 DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, D 202/1997 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, LEY 9/1998 DE PESCA MARÍTIMA, D 32/2004 CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS. RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. RIESGOS TECNOLÓGICOS: ----- FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: TURISMO BALNEARIO Y DEPORTIVO, PESCA DEPORTIVA. ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA ADECUACIÓN, PÉRDIDA DE LOS VALORES ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS DE LA ZONA.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
REGENERACIÓN DE LA PLAYA TRAS LA RUPTURA DEL SISTEMA LITORAL POR EL DESARROLLO URBANÍSTICO. ALTERACIÓN EN EL TRANSPORTE Y DEPÓSITO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE ARENAS CON LA PÉRDIDA SUPERFICIAL DE PLAYA. DERIVADA DE LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS.



UAH Nº 09	FONDOS Y AGUAS MEDITERRÁNEAS
DESCRIPCIÓN	
SINGULARIZACIÓN: MEDIO MARÍTIMO LITORAL. MAR TERRITORIAL.	
LOCALIZACIÓN: AL ESTE PENINSULAR DENTRO DE LA UNIDAD DE PAISAJE LITORAL DE LA COSTA DE AZAHÁR.	
SUBTIPOS: -----	
MEDIO FÍSICO-NATURAL	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: FONDOS ROCOSOS Y ARENAS DEL HOLOCENO.	
ALTURAS: DE -5 M A -300 M.	
PENDIENTES: MODERADAS A FUERTES.	
PROCESOS: MORFOGENESIS SUBMARINA. DINÁMICA LITORAL DENTRO DEL DOMINIO MARÍTIMO.	
TIPOS DE SUELOS: SIN SUELO. SEDIMENTO ARENOSO Y SUSTRATO ROCOSO.	
BALANCE MORFOEDÁFICO: SIN VALOR EDÁFICO.	
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.	
HIDROLOGÍA	
TIPO DE DRENAJE: MAR ABIERTO.	
CUENCA Y SUBCUENCA: MAR MEDITERRÁNEO.	
SUPERFICIAL	SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: -----	-----
VEGETACIÓN NATURAL	
FORMACIONES POTENCIALES: FITOPLANCTON, COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A FONDOS DUROS Y FANEROGAMAS SOBRE FONDOS BLANDOS.	
FORMACIONES PRESENTES: FITOPLANCTON, COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A FONDOS DUROS Y FANEROGAMAS SOBRE FONDOS BLANDOS.	
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: <i>Cystoseira stricta</i> , <i>C. crinita</i> , <i>C. usneoides</i> , <i>Laminaria ochroleuca</i> , <i>Saccorhiza polyschides</i> , <i>Asparagopsis armata</i> , <i>Cladostephus spongiosus</i> , <i>Coralina elongata</i> , <i>Dictyota dichotoma</i> , <i>Ceramium rubrum</i> , <i>Lithophyllum incrustans</i> , <i>Fucus spiralis</i> , <i>Halopteris scoparia</i> , <i>Jania rubens</i> , <i>Mesopyllum lichenoides</i> , <i>Plocamium cartilagineum</i> , <i>Ulva rigida</i> , <i>Enteromorpha ramulosa</i> , <i>E. prolifera</i> ;	
FANEROGAMAS: <i>Posidonia oceánica</i> , <i>Cymodocea nodosa</i> .	
FAUNA	
ESPECIES: ZOOPLANCTON; ESPONJAS: <i>Aplysilla rosea</i> , <i>Cliona rodhensis</i> ; CNIDARIOS: <i>Actinia equina</i> , <i>Lovenella clausa</i> ; MOLUSCOS: <i>Tapes decussatus</i> , almeja fina, <i>Lithophaga lithophaga</i> , dátil de mar, <i>Alvania</i> spp., <i>Cingula amabilis</i> , <i>Gibberula philippii</i> , <i>Mitrella maldonadoi</i> , <i>Murex</i> spp., <i>Littorina rudis</i> , <i>Chomodoris purpurea</i> , <i>Aplysia punctata</i> , <i>Chlamys varia</i> , <i>Callista chione</i> , <i>Pecten maximus</i> , <i>Tellina fabula</i> , <i>Leptochiton algesirensis</i> ; POLIQUETOS: <i>Capitomastus minimus</i> , <i>Eulalia viridis</i> , <i>Naereis laevigata</i> ; CRUSTACEOS: <i>Chthamalus stellatus</i> , <i>Acasta spongites</i> , <i>Palinurus elephas</i> , langosta roja, <i>Palaemon elegans</i> , quisquilla, <i>Pisa tetraedon</i> , <i>Nebalia bipes</i> , <i>Janira maculosa</i> , <i>Caprella grandimana</i> ; EQUINODERMOS: <i>Antenedon bifida</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Arbacia lixula</i> , erizos, <i>Marthasterias glacialis</i> , estrella de mar verde, <i>Ophioderma longicauda</i> ; ASCIDIAS: <i>Phallusia fumigata</i> , <i>Polysincraton lacazei</i> ; PECES: <i>Parablennius rouxi</i> , <i>Solea solea</i> , lenguado, <i>Mugil</i> spp., <i>Liza</i> spp., lisas, <i>Dicentrarchus labrax</i> , lubina, <i>Diplodus</i> spp., sargos, <i>Sparus aurata</i> , dorada; AVES: <i>Larus</i> spp., gaviotas, <i>Sterna sandvicensis</i> , charrán patinegro, <i>Chlidonias niger</i> , fumarel común, <i>Phalacrocorax carbo</i> , cormorán grande; MAMÍFEROS: <i>Delphinus delphis</i> , delfín común, <i>[Tursiops truncatus]</i> , delfín mular, <i>[Grampus griseus]</i> , calderón gris, <i>[Stenella coeruleoalba]</i> , delfín listado, <i>[Orcinus orca]</i> , orca común.	


MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: TRÁFICO MARÍTIMO, PESCA, TURISMO. CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: PECIOS.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: MAR ABIERTO.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. ANTROPIZACIÓN POR EL TRÁFICO MARÍTIMO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 38/89 NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HABITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, RD 942/01 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL ATÚN CAPTURADO EN EL ÁREA DEL ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES (APICD), LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
AUTONÓMICA: LEY 11/1994 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LEY 9/1998 DE PESCA MARÍTIMA, D 78/2001 POR EL QUE SE APRUEBA EL PORN. DE LA SIERRA DE IRTA, D 108/2002, DE 16 DE JULIO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SIERRA DE IRTA Y RESERVA MARINA DE IRTA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS.
RIESGOS LITORALES: MODERADOS A ALTOS. TEMPESTADES, TEMPORALES CON FUERTES VIENTOS, CORRIENTES MARINAS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS A ALTOS. DERIVADOS DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y DE LOS VERTIDOS DE LOS NÚCLEOS URBANOS COSTEROS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. LOS FONDOS PRESENTAN UNA GRAN BIODIVERSIDAD. EN GRAN PARTE DECLARADA PARQUE NATURAL Y ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: DERIVADOS DEL TRÁFICO MARÍTIMO.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: TRÁFICO MARÍTIMO, PESCA, TURISMO.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA ADECUACIÓN DE LOS USOS. SE REQUIERE ELIMINAR LOS VERTIDOS SIN DEPURAR. NECESIDAD DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA TENDENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS SIN ADECUADA DEPURACIÓN.
CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO MARÍTIMO. DERIVADA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y DEPORTIVA. SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.




UAH Nº 10		CASCO HISTÓRICO DE PEÑÍSCOLA	
SINGULARIZACIÓN: EDIFICACIONES TRADICIONALES EN EL INTERIOR DEL HISTÓRICO RECINTO AMURALLADO DE PEÑÍSCOLA.		MEDIO SOCIOECONÓMICO	
LOCALIZACIÓN: SOBRE EL PEÑÓN CALIZO DEL TÓMBOLO.		USOS Y APROVECHAMIENTOS	
SUBTIPOS: ACANTILADO Y ASENTAMIENTO URBANO.		APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICO- RESIDENCIAL.	
MEDIO NATURAL		CUBIERTA DEL SUELO: ANTRÓPICA.	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA		ÍNDICE DE COBERTURA: ----	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS MESOZOICAS.		PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	
MORFOLOGÍA: ROTURADA POR EL ASENTAMIENTO HUMANO.		ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, RECINTO AMURALLADO, TEMPLO PARROQUIAL DE LA VIRGEN DEL SOCORRO. CASERÍO TRADICIONAL.	
ALTURAS: 0 m a 33 m.		YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: LOS RECONOCIDOS EN LAS CALLES GENERAL ARANDA, Nº 3 ESQ Y GONZÁLEZ GRANDA, Nº 2 Y 4.	
PENDIENTES: MODERADAS A FUERTES.		PAISAJE	
PROCESOS: INTERRUMPIDOS POR ASENTAMIENTO HUMANO.		TIPOLOGÍA: MONUMENTAL Y URBANO TRADICIONAL, PUEBLO MARINERO.	
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.		GRADO DE NATURALIDAD: BAJO.	
BALANCE MORFOEDÁFICO: ----		LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL	
APTITUD AGROLÓGICA: SIN APTITUD AGROLÓGICA.		ESTATAL:	
HIDROLOGÍA		LEY 18/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APPLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS. RD 509/96 NORMAS APPLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y EN MENOR MEDIDA SUBTERRÁNEO.		AUTONÓMICA:	
CUENCA Y SUBCUENCA: ----		LEY 2/1992 DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, D 202/1997 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, LEY 4/1998 DEL PATRIMONIO CULTURAL, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	
SUPERFICIAL		CAPACIDAD DE USO	
CURSOS DE AGUA: ----		VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES	
SUBTERRÁNEA		RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.	
ACUIFERO CARBONATADO.		RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS.	
VEGETACIÓN NATURAL		RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS.	
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae- Querceto rotundifoliae sigmetum</i>).		RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.	
FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILA, ORNAMENTALES Y RUDERALES.		RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS.	
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA Y ORNAMENTAL.		RIESGOS TECNOLÓGICOS: ----	
FAUNA		FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1; ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.	
ESPECIES: AVES: cormorán moñudo <i>Phalacrocorax aristotelis</i> , cormorán grande <i>Ph. carbo</i> , gaviota de Audouin, <i>Larus audouinii</i> , gaviota cabecinegra [<i>Larus melanocephalus</i>], gaviota patiamarilla, <i>Larus cachinnans michaelis</i> , cernícalo vulgar [<i>Falco tinanculus</i>], lechuza común [<i>Nyctale alba</i>]; FAUNA ANTROPÓFILA.		APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS	
		APTITUD/VOCACIÓN: TURÍSTICA- RESIDENCIAL.	
		ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA.	
		PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL	
		ESTADO RUINOSO DE ALGUNAS DE LAS EDIFICACIONES. IMPACTO VISUAL POR EL GRAN NÚMERO DE ANTENAS TELEVISIVAS. DERIVADA DE LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS Y DEL TRÁFICO.	

UAH Nº 10

CASCO HISTÓRICO DE PEÑÍSCOLA

UAH Nº 11	CRECIMIENTO URBANO RESIDENCIAL	
	SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES, OFICIALES Y TURÍSTICAS EN EXPANSIÓN DEL ASENTAMIENTO ORIGINAL.	
	LOCALIZACIÓN: AL OESTE DEL CASCO ANTIGUO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINACIÓN SUR DEL MARJAL DE PEÑÍSCOLA.	
	SUBTIPOS: -----	
	MEDIO NATURAL	
	GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
	MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS DE MATERIAL ALUVIAL.	
	MORFOLOGÍA: OCULTADA POR ASENTAMIENTO HUMANO.	
	ALTURAS: <75M.	
	PENDIENTES: SUAVES.	
	PROCESOS: INTERRUMPIDOS POR EL ASENTAMIENTO HUMANO.	
	TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.	
	BALANCE MORFOEDÁFICO: -----	
	APTITUD AGROLÓGICA: SIN APTITUD AGROLÓGICA.	
	HIDROLOGÍA	
	TIPO DE DRENAJE: PRINCIPALMENTE SUPERFICIAL.	
	CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE ALCALÁ.	
	SUPERFICIAL	SUBTERRÁNEA
	CURSOS DE AGUA: -----	ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.
	VEGETACIÓN NATURAL	
	FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae- Querceto rotundifoliae sigmetum</i>) y GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES COSTEROS.	
	FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS Y RUDERALES.	
	ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA Y ORNAMENTAL.	
	FAUNA	
	ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.	
	MEDIO SOCIOECONÓMICO	
	USOS Y APROVECHAMIENTOS	
	APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL-TURÍSTICO Y COMERCIAL.	
	CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA VEGETAL PROPIAMENTE DICHA, ORNAMENTALES Y JARDINES.	
	ÍNDICE DE COBERTURA: -----	
	PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	
	ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----	
	YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----	
	PAISAJE	
	TIPOLOGÍA: PAISAJE URBANO DE MARCADA TENDENCIA TURÍSTICA (OFERTA DE "VISTAS AL MAR"), CON IMPORTANTES FLUCTUACIONES EN LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.	
	GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTRÓPICO, DEFINIDO POR LA EDIFICACIÓN, CON PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES.	
	LEGISLACION AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL	
	ESTATAL:	
	LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.	
	AUTONÓMICA:	
	LEY 2/1992 DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LEY 11/1994 DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D 202/1997 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, LEY 10/2000 DE RESIDUOS, D 78/2001 PORN DE LA SIERRA DE IRTA, D 108/2002 DE DECLARACIÓN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SERRA DE IRTA, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004, DE 27 DE POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	
	CAPACIDAD DE USO	
	VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES	
	RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS Y BAJOS.	
	RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS.	
	RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS A ALTOS.	
	RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.	
	RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS.	
	RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS.	
	FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5; BAJA CALIDAD Y BAJA FRAGILIDAD.	
	APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS	
	APTITUD/VOCACIÓN: RESIDENCIAL Y PEQUEÑA INDUSTRIA-COMERCIO COMPATIBLE.	
	ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA EN LAS PORCIONES DE BAJA PENDIENTE Y MODERADA EN LOS CRECIMIENTOS EN LADERA Y SOBRE LAS ESTRIBACIONES SERRANAS.	
	PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL	
	RELACIONADO CON EL TRÁFICO RODADO Y CON LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS (RUIDO). PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INCOMPATIBILIDAD DE USOS CON LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE IRTA.	
	UAH Nº 11 CRECIMIENTO URBANO RESIDENCIAL	
		
		

UAH Nº 12		PERIURBANO DE PORTONEGRO	
SINGULARIZACIÓN: PARCELARIOS CON PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES MARGINALES POR LA EXPANSIÓN DE LA URBANIZACIÓN. LOCALIZACIÓN: AL SUR DEL NÚCLEO POBLACIONAL DE PEÑÍSCOLA. SUBTIPOS: ----		MEDIO SOCIOECONÓMICO	
MEDIO NATURAL		USOS Y APROVECHAMIENTOS	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA		PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CONGLOMERADOS, BLOQUES DE CALIZA Y CUARZO CON MATRIZ DE ARCILLA Y ARENA. MORFOLOGÍA: ROTURADA POR LAS ACCIONES HUMANAS. ALTURAS: 3 m A 63 m. PENDIENTES: SUAVES. PROCESOS: INTERRUMPIDOS POR EL ASENTAMIENTO HUMANO. TIPOS DE SUELOS: CAMBISOLES CÁLCICOS. BALANCE MORFOEDÁFICO: TENDENCIA A LA MORFOGÉNESIS. APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA A BAJA (MARGINAL).		PAISAJE	
HIDROLOGÍA		LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL DIRECTA Y ESCORRENTÍA. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR. SUBCUENCA DE SANT ANTONI.		ESTATAL:	
SUPERFICIAL		AUTONÓMICA:	
CURSOS DE AGUA: BARRANCO DE FONT NOVA Y ARROYO DE SANT ANTONI.		CAPACIDAD DE USO	
SUBTERRÁNEA		VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES	
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.		APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS	
VEGETACIÓN NATURAL		PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL	
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum</i>). FORMACIONES PRESENTES: RUDERALES Y ORNAMENTALES. PINARES NATURALIZADOS Y MATORRAL DE <i>Quercus cocciferae- Pistacieto lentisci</i> . ESPECIES: Pino carrasco, <i>Pinus halepensis</i> , ciprés, <i>Cupressus arizonica</i> , algarrobo <i>Ceratonia siliqua</i> , acebuche, <i>Olea europaea sylvestris</i> , coscoja <i>Quercus coccifera</i> , lentisco, <i>Pistacia lentiscus</i> , esparraguera, <i>Asparagus albus</i> , brezo <i>Erica multiflora</i> , palmito, <i>Chamaerops humilis</i> , zarzamora, <i>Rubus ulmifolius</i> , romero, <i>Rosmarinus officinalis</i> . FLORA RUDERAL Y ANTROPÓFILA.		ABANDONO DE LA LABORES AGRÍCOLAS POR LA PRESIÓN URBANÍSTICA, CON EL CONSIGUIENTE INCREMENTO DEL RIESGO DE INCENDIO. PRESENCIA DE ESPECIES INVASIVAS Y EXÓTICAS CON CAPACIDAD NATURALIZANTE. INCREMENTO DE LOS PROCESOS EROSIVOS POR PÉRDIDA DE CUBIERTA VEGETAL.	
FAUNA			
ESPECIES: ANFIBIOS: rana común, <i>Rana perezi</i> , sapo común, <i>Bufo bufo</i> ; REPTILES: lagartija colilarga, <i>Psamodromus algeris</i> , culebra bastarda, <i>Malpolon monspessulanus</i> ; AVES: curruca cabecinegra, [<i>Silvia melanocephala</i>], pinzón vulgar, <i>Fringilla coelebs</i> , jilguero, <i>Carduelis carduelis</i> , ratonero común [<i>Buteo buteo</i>], mochuelo, [<i>Athene noctua</i>]; MAMÍFEROS: erizo común, <i>Erinaceus europaeus</i> , murciélago común, [<i>Pipistrellus pipistrellus</i>]; CAZA MENOR. ANTROPÓFILA.			
		UAH Nº 12 PERIURBANO DE PORTONEGRO	
			
			

UAH Nº 13	EDIFICADO TURÍSTICO LITORAL
SINGULARIZACIÓN: EDIFICACIONES DE GRAN ALTURA DISPUESTAS PARALELAS AL LITORAL EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA. LOCALIZACIÓN: A LO LARGO DE LA PLAYA NORTE DE PEÑÍSCOLA. SUBTIPOS: -----	
MEDIO NATURAL	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS CUARZIFERAS CON RESTOS CONCHÍFEROS. MORFOLOGÍA: ROTURADA POR LAS ACCIONES HUMANAS. ALTURAS: 0 m A 3 m. PENDIENTES: MUY SUAVES. PROCESOS: INTERRUMPIDOS POR EL ASENTAMIENTO HUMANO. TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. BALANCE MORFOEDÁFICO: ----- APTITUD AGROLÓGICA: SIN APTITUD AGROLÓGICA.	
HIDROLOGÍA	
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL DIRECTA Y ESCORRENTÍA. CUENCA Y SUBCUENCA: JÚCAR.	
SUPERFICIAL	SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: NO PRESENTA.	ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.
VEGETACIÓN NATURAL	
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA VALENCIANO-TARRACONENSE, MURCIANO-ALMERIENSE E IBICENCA BASÓFILA DE <i>Quercus rotundifolia</i> O ENCINA (<i>Rubio longifoliae- Querceto rotundifoliae sigmetum</i>). GEOMACROSERIE DE LAS DUNAS Y ARENALES COSTEROS. FORMACIONES PRESENTES: ANTROPICAS Y ARVENSES. ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA Y ORNAMENTAL.	
FAUNA	
ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.	

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICO - RESIDENCIAL CUBIERTA DEL SUELO: ARTIFICIAL. ÍNDICE DE COBERTURA: -----
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----
PAISAJE
TIPOLOGÍA: RESIDENCIAL MUY INTENSIFICADO Y CONTINUO ENTRE LAS ÁREAS INTERIORES Y EL LITORAL CON DISPOSICIÓN Y VISTAS HACIA EL LITORAL. GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ARTIFICIAL MUY ANTROPIZADO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
AUTONÓMICA: D 156/1999 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES, LEY 2/1992 DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, D 202/1997 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, D 32/2004 POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS. RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. RIESGOS TECNOLÓGICOS: ----- FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5; BAJA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: TURÍSTICO- RESIDENCIAL ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA ADECUACIÓN POR EL EFECTO DE BARRERA, TANTO VISUAL COMO FÍSICA, DEL EDIFICADO CONTINUO COLMATANDO EL FRENTE LITORAL.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
RUPTURA DEL EQUILIBRIO DEL SISTEMA LITORAL POR UBICARSE EN PARTE SOBRE EL CORDÓN DUNAR ORIGINAL. FUERTE IMPACTO VISUAL POR LA ELEVADA DENSIDAD Y CONTINUIDAD DE LA EDIFICACIÓN CREANDO PANTALLA ENTRE LA VEGA INTERIOR Y EL LITORAL. PROBLEMAS DERIVADOS DEL TRÁFICO Y LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS.



UAH Nº 14		PUERTO DE PEÑÍSCOLA	
SINGULARIZACIÓN: AGUAS INTERIORES, MUROS DE ATRAQUE Y ESCOLLERAS QUE CONSTITUYEN EL FIRME DE LA EDIFICACIÓN PORTUARIA.		MEDIO SOCIOECONÓMICO	
LOCALIZACIÓN: EN EL FLANCO SUR DEL RECINTO AMURALLADO DEL CASTILLO.		USOS Y APROVECHAMIENTOS	
SUBTIPOS: -----		APROVECHAMIENTOS: RECREATIVO-DEPORTIVO Y PESQUERO.	
MEDIO NATURAL		CUBIERTA DEL SUELO: -----	
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA		ÍNDICE DE COBERTURA: -----	
MATERIALES CONSTITUTIVOS: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.		PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	
MORFOLOGÍA: ESPIGONES Y DÁRSENA.		ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----	
ALTURAS: 0 m A 3 m.		YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----	
PENDIENTES: MUY SUAVES.		PAISAJE	
PROCESOS: INFLUENCIA MAREAL. EROSIÓN MARINA. COLMATACIÓN DE SU FONDO.		TIPOLOGÍA: PORTUARIO.	
TIPOS DE SUELOS: -----		GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTROPIZADO.	
BALANCE MORFOEDÁFICO: -----		LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL	
APTITUD AGROLÓGICA: -----		ESTATAL:	
HIDROLOGÍA		LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.	
TIPO DE DRENAJE: -----		AUTONÓMICA:	
CUENCA Y SUBCUENCA: -----		LEY 9/1998 DE PESCA MARÍTIMA, D 32/2004 CREA Y REGULA EL CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA, LEY 4/2004 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	
SUPERFICIAL	SUBTERRÁNEA	CAPACIDAD DE USO	
CURSOS DE AGUA: -----	-----	VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES	
VEGETACIÓN NATURAL		RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.	
FORMACIONES POTENCIALES: FITOPLANCTON, FANEROGAMAS SOBRE FONDOS BLANDOS Y COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A FONDOS DUROS.		RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS.	
FORMACIONES PRESENTES: PRÁCTICAMENTE SIN FORMACIONES NATURALES.		RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS.	
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.		RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.	
FAUNA		RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS.	
ESPECIES: PECES: serrano, <i>Serranus spp.</i> , mojarras, <i>Diplodus spp.</i> , AVES: <i>Larus spp.</i> , gaviotas. FAUNA ANTROPÓFILA.		RIESGOS TECNOLÓGICOS: -----	
		FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE3: FRAGILIDAD VARIABLE Y CALIDAD VISUAL MEDIA A ALTA.	
		APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS	
		APTITUD/VOCACIÓN: PORTUARIO PESQUERO Y NÁUTICO-DEPORTIVO.	
		ADECUACIÓN DE LOS USOS: ADECUADA.	
		PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL	
		DERIVADA DE VERTIDOS PUNTUALES PROCEDENTES DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS Y DEPORTIVAS.	

UAH Nº 14
PUERTO DE
PEÑÍSCOLA

